

ОРВИ у Вашего малыша
может привести
к тяжелому заболеванию



РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВРАЧЕЙ,
В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ПАЦИЕНТОВ.

Информация для родителей:
как сократить риск РСВ-инфекции?

Находится ли Ваш ребенок в группе риска тяжелого течения РСВ-инфекции?

У многих детей РСВ-инфекция проявляется в симптомах, схожих с простудой.¹ Однако в некоторых случаях, чаще всего у **недоношенных детей и детей с врожденными пороками сердца** или **бронхолегочной дисплазией**, РСВ может вызвать тяжелое поражение легких. Если это произошло, Ваш ребенок может серьезно заболеть и потребуются его госпитализация.¹ РСВ может стать причиной пневмонии или бронхоолита в первый год жизни.¹

Недоношенные дети

Ваш ребенок находится в группе риска заражения РСВ, если он был рожден раньше срока – до 35-й недели беременности включительно и на момент начала сезона инфекции ему меньше 6 месяцев.¹

Бронхолегочная дисплазия (БЛД)

Бронхолегочная дисплазия – заболевание легких, которое чаще всего проявляется у недоношенных детей, в течение долгого срока находившихся на искусственной вентиляции легких и получавших кислород дополнительно.¹

Врожденные пороки сердца

Существует несколько типов врожденных пороков сердца. Некоторые из них могут увеличивать риск развития тяжелых форм РСВ-инфекции.^{1,2}

Симптомы РСВ-инфекции

Симптомы РСВ-инфекции сначала могут быть схожи с симптомами простуды и включают:

- Жар
- Насморк
- Беспокойство
- Отказ от еды.¹

Симптомы РСВ-инфекции могут быть более серьезными, когда она затрагивает легкие. Тогда у ребенка появляются:

- Частый и глубокий кашель
- Затрудненное свистящее и прерывистое дыхание
- Посинение губ и кончиков пальцев
- Одышка
- Затрудненное дыхание при кормлении грудью или из бутылочки.¹



Легко ли заразиться РСВ?

Да, это очень легко.¹

- РСВ – это очень распространенный вирус, передающийся воздушно-капельным путем, когда зараженный человек чихает или кашляет.
- РСВ также передается при любом физическом контакте: касании, поцелуе или простом рукопожатии с носителем вируса.
- РСВ может жить часами на использованном носовом платке или, например, на поверхности стола.
- РСВ-инфекция очень распространена в многолюдных помещениях и детских садах.

Поэтому Вы должны быть очень осторожны и предпринимать все возможное, чтобы Ваш ребенок не заразился РСВ.¹

Как уменьшить риск заражения РСВ-инфекцией?

- Мойте руки дезинфицирующим средством или теплой водой с мылом перед тем, как контактировать с ребенком.
- Если у Вас простуда или жар, пожалуйста, не целуйте ребенка, старайтесь избегать контакта с ним.
- Не допускайте контакта ребенка с простуженными людьми.
- Не посещайте с ребенком места большого скопления людей (детские сады, торговые центры, большие семейные торжества и др.)
- Не курите рядом с ребенком. Запретите курение у себя дома во всех местах, включая балкон и туалет.

РСВ

Что необходимо запомнить?¹

1. РСВ – очень заразный вирус. Для того чтобы снизить риск заражения Вашего ребенка, следуйте советам этой брошюры.
2. Специфических методов лечения РСВ-инфекции не существует. Поэтому общепризнанный подход иммунопрофилактика тяжелого течения инфекции у недоношенных детей до 6 месяцев и детей с пороками сердца и бронхолегочной дисплазией до 2-х лет. Иммунопрофилактика – это пассивная иммунизация с помощью готовых антител. Готовые антитела отличаются от вакцины тем, что не вызывают иммунный ответ организма, а воздействуют непосредственно на вирус, подавляя его способность повреждать легкие ребенка. Иммунопрофилактика – это не вакцинация.
3. Иммунопрофилактика проводится в эпид сезон, который может отличаться в зависимости от региона. Чаще всего эпид сезон длится с октября по апрель.
4. Иммунопрофилактика считается эффективной при курсе в 5 инъекций.³ Только регулярные ежемесячные инъекции помогают защитить Вашего малыша.



ПОЧЕМУ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ РЕКОМЕНДОВАНА ИММУНОПРОФИЛАКТИКА РСВ-ИНФЕКЦИИ?

Иммунопрофилактика помогает предотвратить инфекцию, вызываемую респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) и приводящую к тяжелому поражению легких. Иммунопрофилактика показана если:

- Ваш ребенок родился недоношенным
- Вашему ребенку поставлен диагноз бронхо-легочная дисплазия (БЛД)
- Вашему ребенку поставлен диагноз гемодинамически значимый порок сердца

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Вашему ребенку рекомендовано проведение пассивной иммунизации с помощью готовых антител. Иммунопрофилактика — это не вакцинация. Такой препарат отличается от вакцины тем, что не вызывает иммунного ответа организма, а воздействует непосредственно на вирус, подавляя его способность повреждать легкие ребенка. Каждое введение препарата обеспечивает защиту Вашего ребенка от РСВ-инфекции в течение одного месяца до того, как потребуется следующая инъекция. Очень важно, чтобы иммунизация Вашего малыша проводилась ежемесячно на протяжении всего сезона инфекции. Уточнить конкретные сроки начала и завершения иммунопрофилактики Вы можете у лечащего врача. Если по каким-либо причинам Вы пропустили назначенный прием для проведения иммунизации, обратитесь к доктору как можно скорее.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК РОЖДЕН НЕ В СЕЗОН РСВ-ИНФЕКЦИИ...

...он все еще может находиться в группе риска тяжелого течения инфекции в предстоящий период высокой заболеваемости. Именно поэтому доктор рекомендовал иммунопрофилактику для Вашего малыша. Первое введение препарата обычно проводится непосредственно перед началом сезона РСВ-инфекции в регионе, где Вы живете.

КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА ОТ РСВ-ИНФЕКЦИИ?

1. Уточните у лечащего доктора ожидаемые сроки начала сезона РСВ-инфекции в Вашем регионе.
2. Договоритесь о регулярном посещении клиники, чтобы иммунизация Вашего малыша проводилась ежемесячно в течение всего сезона РСВ-инфекции.

ВАЖНО: Наиболее эффективным считается курс из 5 инъекций.³ В случае если Ваш ребенок родился в феврале-марте, он может получить курс из 3-х инъекций до окончания эпид сезона. Это также будет являться полноценной защитой от РСВ-инфекции



Пожалуйста, обратитесь к врачу за подробной информацией.

КАК УМЕНЬШИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ РСВ-ИНФЕКЦИЕЙ?

- Попросите каждого, кто контактирует с Вашим малышом, сначала протереть руки дезинфицирующим средством или помыть теплой водой с мылом.
- Если у Вас простуда или жар, пожалуйста, не целуйте ребенка, старайтесь избегать близкого контакта с ним.
- Не допускайте контакта ребенка с простуженными людьми.
- Не посещайте с ребенком места большого скопления людей (детские сады, торговые центры, большие семейные торжества и др.)
- Не курите рядом с ребенком. Запретите курение у себя дома во всех местах, включая балкон и туалет.

ВАЖНО: Не пропускайте и не откладывайте очередной визит в клинику, если только это не рекомендовал Ваш доктор. Помните, что только регулярные ежемесячные инъекции помогают защитить Вашего малыша от тяжелой РСВ-инфекции.



ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩЕНИИ КЛИНИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ РСВ-ИНФЕКЦИИ



Имя и фамилия ребенка: _____

ФИО лечащего врача: _____

ФИО медицинской сестры: _____

Телефон для контактов: _____

Дата первой иммунизации: _____


ИММУНИЗАЦИЯ	ДАТА ВИЗИТА В КЛИНИКУ (ДД/ММ/ГГ)	МАССА ТЕЛА РЕБЕНКА (КГ)	РЕКОМЕНДАЦИИ
1 ВВЕДЕНИЕ			
2 ВВЕДЕНИЕ			
3 ВВЕДЕНИЕ			
4 ВВЕДЕНИЕ			
5 ВВЕДЕНИЕ			



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Blank lined area for notes.





Источники:

1. Е.С. Кешишян, Профилактика респираторно-синцитиальной вирусной инфекции у детей из групп риска в первые два года жизни: актуальность, эффективность, вопросы организации, РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 3, 2013
2. Е.Л. Бокерия, Е.А. Дегтярева, РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ, 5, 2014
3. Krilov et al. Partial palivizumab prophylaxis and increased risk of hospitalization due to respiratory syncytial virus in a Medicaid population: a retrospective cohort analysis. BMC Pediatrics 2014, 14:261

ООО «ЭББВи»
125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 7
БЦ «Белые Сады», здание «А»
Тел.: +7 (495) 258-42-77
Факс: +7 (495) 258-42-87

abbvie